

# Sustituto Lácteo Pronutra con Probiótico



**Sustituto Lácteo para ser utilizado en la crianza artificial de terneros a partir de los 3 a 5 días de vida.**

## COMPOSICIÓN

Proteína Bruta	(mín.)	20,0%
Extracto Etéreo	(mín.)	15,0%
Fibra Cruda	(mín.)	0,5%
Calcio	(mín.) - (máx.)	0,8% - 1,2%
Fósforo	(mín.) - (máx.)	0,6% - 1,0%
Minerales Totales	(máx.)	6,0%
Humedad	(máx.)	8,0%
Energía Metabolizable		3,5 Mcal/kg

Contiene Probiótico (levaduras vivas) que contribuyen al equilibrio saludable de la flora intestinal.

## DOSIFICACIÓN DEL SUSTITUTO LÁCTEO PRONUTRA GOLD Y PLATINUM

Días de Entrada a La Crianza	Días por Período	Dosificación según el porcentaje de Peso Vivo del Ternero	Cantidad de Sustituto Lácteo por día para un ternero de 41,6 kg. de Peso Vivo. Ej.:
1 a 25 días	24	12%	2 tomas de 2,5 litros <sup>o</sup> /u.
26 a 40 días	14	10%	2 tomas de 2,2 litros <sup>o</sup> /u.
41 a 50 días	9	8%	2 tomas de 2 litros <sup>o</sup> /u.



## INDICACIONES DE USO

- Agregar 125 gramos de Sustituto Lácteo Pronutra con Probiótico y completar con agua hasta alcanzar 1 (un) litro final.
- Utilizar agua caliente, a una temperatura máxima de 50° C para lograr una mejor dilución. Posteriormente, suministrar al ternero/a a una temperatura final que no supere los 36-37° C.
- Suministrar alimento balanceado iniciador a voluntad desde los primeros días de la crianza, aproximadamente desde los 3-7 días de vida del ternero/a.
- Se podrá cortar el suministro del Sustituto Lácteo Pronutra con Probiótico cuando el ternero/a consuma 1 kg. de alimento balanceado iniciador por el término de 5 (cinco) días seguidos. No obstante, consultar siempre con un profesional.
- Para el caso de épocas de lluvias, temporales o temperatura muy bajas (5° C a 0° C o por debajo de 0° C) suministrar una tercer toma de 2 litros con la misma concentración (125 gramos/litro) del Sustituto Lácteo Pronutra a las 4 horas posteriores de la toma de la mañana, manteniendo siempre la misma hora y la misma temperatura.

## IMPORTANTE

Mantener siempre el mismo horario y temperatura de toma del sustituto preparado.

Garantizar la higiene de los recipientes utilizados (tetinas, baldes, mamaderas, etc.) en cada toma.

Comprobar que el agua utilizada es apta para el consumo animal.

Cerrar bien la bolsa luego de su uso y mantener en un lugar limpio y seco. No exponer en forma directa a la luz solar.

Desechar el sobrante del sustituto lácteo diluido no consumido por el ternero/a.

Es conveniente no suministrar agua dentro de las dos horas posteriores a la toma del sustituto.

### Eurotec Nutrition Argentina S.R.L.

Av. Vieytes 1828/42, (C1275AGV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Telefax: (011) 4303-1213/ 5751/ 5752

e-mail: eurotec@eurotec.com.ar

[www.eurotec.com.ar](http://www.eurotec.com.ar)



**EUROTEC**  
NUTRITION  
ARGENTINA

